

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO

(Siga las recomendaciones de un profesional en agronomía)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nutriphos 8-30-0 es un fertilizante líquido a base de Polifosfato de Amonio de alta eficiencia, con capacidad quelatante (débil) y menor fijación en el suelo. Suple o corrige las necesidades de P en los cultivos, y es ideal para ser aplicado en forma líquida al suelo o sustrato, en drench, en fertirrigación o aspersión foliar.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN

Ingestión: No inducir el vómito, beba abundante agua. En caso de inconsciencia no ingerir nada. **Contacto con la piel y ojos:** Lave las áreas afectadas con abundante agua durante 15 minutos. Si se están usando lentes de contacto, remuévalos inmediatamente. **Inhalación:** Exponga el sujeto a un lugar con abundante aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Si respira con dificultad utilice oxígeno. Contacte en todos los casos al médico de inmediato.

MEDIDAS PARA PROTECCION PERSONAL

Utilizar: gafas de protección y/o mascarilla, guantes de PVC o látex, botas, delantal.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

No contaminar los ríos, estanques o depósitos de agua al lavar los equipos de aplicación.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

No almacene ni transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado alejado del calor, y aparte de herbicidas u otros plaguicidas. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Nutriphos 8-30-0 es compatible con la mayoría de los fertilizantes, coadyuvantes y plaguicidas de uso común. No obstante se recomienda hacer pruebas de compatibilidad preliminares. No es fitotóxico en los cultivos y dosis sugeridos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llene al 50% de la capacidad del recipiente con agua, luego si es necesario agregue los acondicionadores de aguas (reguladores de pH, acidificantes, etc), luego agregue el fertilizante (con el debido equipo de protección) previamente dosificado y comprobado de su compatibilidad, en forma lenta y con agitación constante. Posteriormente termine el aforo al 100% del volumen requerido final.



NUTRIPHOS 8-30-0

FÓSFORO COMO POLIFOSFATO DE AMONIO, DE ALTA MISCIBILIDAD Y EFICIENCIA. PROMOTOR DE RAÍCES Y FUENTE DE ENERGÍA Y VIGOR.

FÓRMULA QUÍMICA

FERTILIZANTE LÍQUIDO

COMPOSICIÓN	FÓRMULA	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Nitrógeno	N-NH ₄	8
Fósforo (Polifosfato)	P ₂ O ₅	30
Ingredientes inertes	-	62
TOTAL	-	100

Contiene: 80 gramos de Nitrógeno (N-NH₄) y 300 gramos de Fósforo (P₂O₅) como Polifosfato, por cada litro de producto comercial.



NUTRIENDO IDEAS INTELIGENTES

WWW.TILAWAAGRO.COM

Densidad: 1,2 - 1,3 g/ml

Fabricado y distribuido por: TERMINALES DEL PACÍFICO, S.A. Belén, Heredia (Ofic.) / Tilarán (Planta) - Costa Rica. Tel: (506) 2293 5493; (506) 2695 5856
Email: servicioalcliente@tilawagroup.com

FORMA DE APLICACIÓN Y USO RECOMENDADO

En aspersión foliar, en drench o en el sistema de riego. **Al suelo:** Aplicar en drench o en sistemas de fertirrigación en dosis de 50 a 250 L/Ha, en varios ciclos y momentos según el criterio técnico experto. **En almácigos:** de 25 a 50 cc por cada kg de sustrato. **Inyectado:** En banano de 1 a 3 cc, mezclada en una solución final con agua de 100-150 cc, inyectada en el tallo de la planta recién cosechada (cabello).

CULTIVO	AL FOLLAJE EN ASPERSIÓN FOLIAR	
	DOSIIS (L/Ha) / CONCENTRACIÓN (%)	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Algodón, Girasol, Higuera, Jatropha	2 - 3 / 1 - 1,5%	2 ciclos, en pre y floración
Almácigos o viveros	1 / 0,5%	Cada 1 a 2 semanas
Banano, Plátano, Abaca	1 / 4%	1 ciclo quincenal (con protectantes)
Caña de Azúcar	2 - 4 / 1-2%	2 a 3 ciclos
Cucurbitáceas (melón, sandía, chayote, etc)	2 - 4 / 1-2%	2 a 4 ciclos
Forestales (Teca, Melina, etc)	1 - 3 / 0,5 - 1,5%	2 ciclos anuales (primeros 3 años)
Frutales (Cítricos, Mango, Melocotón, etc)	1 - 2 / 0,5 - 1%	2 a 4 ciclos anuales
Frutales arbustivos (Café, Uva, etc) y Sábila	1 - 2 / 0,5 - 1%	2 ciclos
Gramíneas (arroz, maíz, sorgo, frijol, soya)	2 - 4 / 1 - 2%	1 a 3 ciclos
Hortalizas (cebolla, repollo, zanahoria, etc)	1 - 3 / 0,5 - 1,5%	4 a 8 ciclos
Papa	2 - 4 / 1 - 2%	4 a 8 ciclos
Palma, Palmita, Coco	4 / 2%	2 ciclos
Pastos y Forrajes	4 / 2%	2 a 4 ciclos
Piña	50-250 / 3 - 1,5%	5 ciclos (a los 1, 2, 3, 5 y 7 mds)
Plantas Ornamentales y Medicinales	1 - 2 / 0,5 - 1%	2 a 3 ciclos
Roices y Tubérculos (yuca, tiquisque, etc)	1 - 3 / 0,5 - 1,5%	2 a 3 ciclos

Aplicación aérea (bajo volumen): En Arroz, Banano y Plátano, Caña de Azúcar, Palma Africana y Piña (Ananas), dosis de 0,5-1,5 L/Ha en mezcla total de 18-24 L/Ha. Para aplicaciones aéreas se debe de cumplir con las recomendaciones del D.E. 31520-M5-MAG-MINAE-MOPT-MCPSP (o de cada país).

Nº LOTE FECHA FORMULACIÓN



Vence: 2 Años después de la fecha de formulación.

REGISTROS: Guatemala #
El Salvador #

Honduras #
Nicaragua #

Costa Rica # 5241
Panamá # 5341

No REG. MAG.: 5241 FECHA REGISTRO: 29 Set, 2006